

BMP De Zwolse Leemputten 2010



Doordat de Achterhoekers graag een huis van steen willen met daar boven op dakpannen, zijn op veel plekken leemputten ontstaan. Met veel mankracht werd de leem naar de steenfabrieken getransporteerd en hierdoor werd denk ik, zeker voor die tijd, ongewild nieuwe natuur gemaakt. Zo ook in de buurtschap Zwolle bij Groenlo. De eerste putten waren vrij smal en ondiep, en omdat de bovenste zandlaag voor en nieuwe put opzij gezet werd, ontstond er steeds een zandwal waarop later de bomen zijn gaan groeien. In 1931 werd er gemoderniseerd en kwam er een baggermachine. Het vervoer naar de fabriek in Groenlo gebeurde vanaf die tijd met een smalspoortrammetje. De putten werden veel dieper en groter, wat nu nog goed te zien is. Hierdoor is er een mooie afwisseling in het gebied ontstaan met smalle en grotere water oppervlakten. In de winter worden deze grotere plassen bevolkt door grote aantalen watervogels en komen er vaak bijzondere soorten voor, tenminste zolang het niet geheel is dicht gevoren.

Hieronder staan de soorten die bij de eerste BMP tellingen van 2010 nog zijn waargenomen.

| | |
|---------------------|---------------|
| Brilduiker | Slobeend |
| Pijlstaart | Tafeleend |
| Wintertaling | Krakeend |
| Nonnetje | Grote Zaagbek |
| Grote Zilver Reiger | |



De Brandganzen die hier met 40 paar aanwezig zijn, zijn vrijwel allemaal nakomelingen van verwilderde exemplaren en broeden nog steeds binnen het afgegaasde gebied. In de winter trekken deze vogels wel weg.



De andere ganzen broeden verspreid over het hele gebied in kleine aantallen, hoewel de Grauwe Gans van 3 paar in 2006 naar 11 in 2010 is gestegen. Van de Grauwe Gans heb ik kunnen constateren dat deze soms worden gepredeerd, waarschijnlijk door de vos, maar dit heeft weinig invloed op hun groeiende aantal.

Als we de ganzen buiten beschouwing laten zijn de aantal broedparen sterk afgenomen, namelijk van 289 in 2002, 283 in 2006 en dan de grote val naar 234 in 2010. Dit is een opmerkelijke daling van 19% die hoofdzakelijk betrekking heeft op de zangvogels.

Van de kleine zangvogels is alleen de Bonte Vliegenvanger sterk toegenomen van 3 in 2002, 5 in 2006 naar 7 paar in 2010.



De grote verliezers zijn Winterkoning, Roodborst, Kleine Karekiet, Merel, Bosrietzanger, Tuinfluiter, Koolmees en de Vink.

Nieuw voor dit plot zijn Zwarte Specht, Putter en de Goudvink.

Hier volgt de totale lijst van broedvogels voor het BMP plot van de Zwolse Leemputten met dank aan al de mede tellers:

| De broedvogels van de Zwolse Leemputten - atlasblok 345500 - plotnummer 3350 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|----|----|----|------------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| Soort | Aantal in | | | | | | Soort | Aantal in | | | | | |
| | 2010 | 2006 | 2002 | 78 | 79 | 80 | | 2010 | 2006 | 2002 | 78 | 79 | 80 |
| Aalscholver | 0 | 2 | | | | | Braamsluiper | 0 | 2 | | | | |
| Fuut | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | Merel | 12 | 17 | 18 | 10 | 2 | 3 |
| Knobbelzwaan | 2 | 3 | 2 | | | | Zanglijster | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
| Grauwe Gans | 11 | 3 | 1 | | | | Grote Lijster | 3 | 2 | 1 | | | |
| Gr. Can.Gans | 3 | 2 | 1 | | | | Bosrietzanger | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Brandgans | 40 | 6 | 7 | | | | Grasmus | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nijlgans | 2 | 1 | 3 | | | | Tuinfluitier | 8 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 |
| Wilde Eend | 3 | 5 | 3 | 24 | 8 | 2 | Zwartkop | 19 | 16 | 18 | 3 | 2 | 3 |
| Soepeend | 0 | | 1 | | | | Tjiftjaf | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 7 |
| Kuifeend | 1 | 2 | 3 | | | | Fitis | 10 | 14 | 12 | 26 | 26 | 22 |
| Sperwer | 0 | 1 | | | | | Goudhaantje | 0 | | 1 | | | |
| Buizerd | 1 | 1 | | | | | Gr.Vliegenvanger | 0 | 4 | 2 | | | |
| Torenavalk | 0 | | 1 | | | | Bonte Vliegenv. | 7 | 5 | 3 | | | |
| Boomvalk | 0 | 1 | | | | | Staatmees | 3 | 3 | 3 | | | |
| Kwartel | 0 | 1 | | | | | Glanskop | 2 | | 4 | | | |
| Fazant | 3 | 3 | 1 | | | | Matkop | 1 | 1 | 2 | | | |
| Waterhoen | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Kuifmees | 1 | | 2 | | | |
| Meerkoet | 7 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | Zwarte Mees | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Holenduif | 1 | 3 | | | | | Pimpelmees | 9 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 |
| Houtduif | 13 | 14 | 14 | | | | Koolmees | 10 | 18 | 15 | 8 | 3 | 2 |
| Turkse Tortel | 0 | 1 | 1 | | | | Boomklever | 5 | 3 | 3 | | | |
| Zomertortel | 1 | 2 | 1 | | | | Boomkruiper | 6 | 5 | 7 | | | |
| Koekoek | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Wielewaal | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bosuil | 0 | 1 | 1 | | | | Vlaamse Gaai | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| ijsvogel | 1 | | 1 | | | | Ekster | 1 | 1 | | | | |
| Groene Specht | 2 | 1 | 1 | | | | Kauw | 0 | | 2 | | | 1 |
| Zwarte Specht | 1 | | | | | | Zwarte Kraai | 2 | 1 | 1 | | | |
| Gr.Bonte specht | 3 | 2 | 3 | | | | Spreeuw | 2 | 3 | 5 | | | |
| Kl.Bonte Specht | 2 | 1 | 2 | | | | Huisemus | 0 | 2 | 0 | | | |
| Boompieper | 0 | 2 | 1 | | | | Ringmus | 0 | 2 | 2 | | | |
| Graspieper | 0 | | 1 | | | | Vink | 13 | 19 | 17 | 3 | 2 | 3 |
| Witte Kwikstaart | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | Groenling | 2 | 3 | 1 | | | |
| Winterkoning | 13 | 15 | 18 | 11 | 3 | 7 | Putter | 1 | | | | | |
| Heggemus | 5 | 5 | 3 | | | | Goudvink | 2 | | | | | |
| Roodborst | 8 | 12 | 12 | 4 | 3 | 7 | Geelgors | 1 | 2 | | | | |
| Gekr.Roodstaart | 3 | 2 | 2 | | | | Rietgors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kleine Karekiet | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 10 | | 2010 | 2006 | 2002 | | | |
| TOTAAL AANTAL BROEDPAREN | | | | | | | | 290 | 295 | 301 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| | TOTAAL AANTAL SOORTEN | 54 | 62 | 60 | | | |
|--|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|

Willie Smeenk