

Houtsnip (*Scolapax rusticola*)

## BMP-Kerkloo

### Resultaten BMP-tellingen Kerkloo 2003

Na een jaar afwezigheid, is dit jaar in het Kerkloo de broedvogelpopulatie opnieuw geïnventariseerd.

Houtsnip (*Scolapax rusticola*)

Sinds de eerste inventarisatie in 1991 hebben we nog niet zoveel soorten kunnen vaststellen als dit jaar. Was 1998 met 46 soorten al een topper, dit jaar hebben we de 50 gehaald. Dit aantal danken we vooral aan een aantal "nieuwkomers". We konden nu voor vier nieuwe soorten ieder één territorium vaststellen. Deze nieuwe soorten waren: de Boomvalk, Houtsnip, Kleine Karekiet en de Kruisbek.

Het aantal territoria (territorium is een voedselgebied dat door het mannetje verdedigd wordt tegen soortgenoten) bleef met 399 echter wat achter ten opzichte van het andere topjaar 1999. Dat jaar 1999, telden we maar liefst 408 territoria van 44 vogelsoorten.

In et totaal hebben we nu sinds 1991, van 62 verschillende soorten vogels minstens één territorium in het Kerkloo kunnen vaststellen. De Spotvogel is ook éénmalig in het bos waargenomen, maar deze was volgens de regels te vroeg. Dit duidt dan op een doortrekker, anders hadden we hem zeker vaker moeten kunnen registreren.

Om eens een iets ander beeld te krijgen heb ik de tabel in tweeën gesplitst. De eerste tabel laat 40 soorten zien die vooral de laatste vijf (zes) jaar, constant met één of meerdere broedparen in het bos aanwezig zijn. De Buizerd is als nieuwkomer in 1998 ook in deze tabel opgenomen. Hiervoor in de plaats had ik ook de Gekraagde Roodstaart of de Goudvink kunnen kiezen.

Van die 40 soorten zijn er een heel aantal die redelijk constant zijn. Sommigen hebben zich hersteld na een kleine dip in het jaar 2001 (MKZ, minder goed geïnventariseerd) zoals de Heggenmus, Fitis, Tjiftjaf en Boomklever. Andere soorten, bijv. Winterkoning, de Lijsters en het Goudhaantje doen het goed en zijn verder in aantal gestegen. Daarentegen laat de Pimpelmees een enorme daling zien van 20 in 2000, via 25 in 2001 naar 13 territoria nu. Ook de Roodborst, Koolmees en Vink laten een behoorlijke daling zien. Een oorzaak kan ik hiervoor nog niet aangeven.

De 40 soorten die nagenoeg elk jaar aanwezig zijn.

Soorten / jaar	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2003
Sperwer	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
Buizerd	--	--	--	--	--	1	1	1	1	1
Fazant	2	3	3	1	2	2	4	--	1	1
Holenduif	3	2	3	7	3	5	5	6	3	5
Houtduif	19	17	19	20	18	19	25	19	31	24
Zomertortel	--	2	--	--	3	2	2	1	1	2
Bosuil	1	1	1	1	--	1	1	1	1	1
Groene Specht	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2
Zwarte Specht	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2



Boomvalk	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Houtsnip	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Tortelduif (Turkse)	--	--	--	--	--	1	--	--	--	1
Koekoek	--	1	--	--	--	1	--	--	--	1
Steenuil	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1
Kleine Bonte Specht	1	1	--	1	2	1	--	1	--	1
Boompieper	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Witte Kwikstaart	--	--	--	--	--	--	--	1	1	1
Kleine Karekiet	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Braamsluiper	1	--	--	--	2	--	--	--	--	1
Grasmus	--	1	1	1	1	--	--	--	--	1
Fluiter	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1
Vuurgoudhaantje	--	--	--	1	1	2	--	1	--	1
Ekster	--	--	--	--	--	--	--	1	2	2
Ringmus	--	--	--	1	--	--	1	--	--	1
Kruisbek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
Groenling	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1
Goudvink	1	--	--	1	1	1	1	1	1	1
Appelvink	1	--	--	--	1	--	1	--	--	1
Geelgors	1	--	1	--	--	1	--	--	--	1
<b>Aantal soorten af en toe</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	
<b>Aantal territoria</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	
<b>Jaar</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	
<b>Totaal aantal soorten</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	
<b>Totaal aantal territoria</b>	<b>323</b>	<b>316</b>	<b>296</b>	<b>352</b>	<b>375</b>	<b>348</b>	<b>408</b>	<b>382</b>	<b>394</b>	


De Torenvalk konden we opnieuw op de kaart zetten in het Kerkloo (west) door een tweetal waarnemingen. Deze waren overigens gedaan in de buurt van het nest dat gebruikt werd in het jaar 2001. Van de Boomvalk zijn een aantal waarnemingen gedaan in het oosten van het Kerkloo. Hier is waarschijnlijk gebroed op een oud kraaiennest.

De Houtsnip is door Bas en Kees op een avondtelling binnengehaald. Gestimuleerd door alle waarnemingen van Houtsnippen tijdens de 24- en de 10-uurs tellingen, zijn zij ook op andere mogelijke Houtsniplocaties gaan luisteren met o.a. dit territorium in het Kerkloo als resultaat.

De Kleine Karekiet werd ook gehoord tijdens de 10-uurs telling. De ronde door het Kerkloo was hierin opgenomen. Hij liet zich van zijn beste kant horen in de begroeiing langs een vijver aan de rand van het Kerkloo (west). Een hele mooie soort, de Kruisbek, een echte bewoner van naaldbossen, werd een aantal keren gehoord in een gedeelte met oude Douglas sparren. Deze vroeg broedende vogels kunnen tijdens inventarisatierondes gemakkelijk worden gemist.

Ook heel leuke waarnemingen zijn die van de Fluiter, een soort die hard achteruit gaat in ons land, en van het Vuurgoudhaantje. Deze laatste soort kan weer snel worden gemist doordat zijn zang heel zacht is en heel hoog van toon.

Tot slot lijkt het er op, dat de Ekster ook tot de vaste vogelgroep van het Kerkloo gaat behoren. Hopelijk blijft het aantal soorten op dit niveau maar mogelijk groeit het aantal nog.



*Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus)*

Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus)

Alex

Visser

VWG Eibergen