

Resultaat Roofvogelinventarisatie 2014 in de gemeente Berkelland:

Oppervlakte: 285 km².

In het voorseizoen is de projectgroep roofvogels bijeengewees en werd afgesproken om alle broedterritoria van de roofvogels in de gemeente Berkelland op kaart te zetten.

In Berkelland kan men alle in ons land voorkomende roofvogels ontmoeten, maar het broeden beperkt zich tot een 7-tal roofvogelsoorten. Dat zijn Torenvalk, Boomvalk, Slechtvalk, Buizerd, Wespendief, Havik en Sperwer.

Om deze inventarisatie enige sturing te geven, werd het gehele werkgebied van onze gemeente verdeeld onder de projectgroep-medewerkers. Enkele delen konden niet worden toebedeeld, maar met de hulp van de SOVON-atlastellers is er toch een nagenoeg dekkend beeld verkregen van de gehele gemeente.

Afgesproken was om niet naar de horsten te gaan zoeken, maar dat het vaststellen van een broedterritorium voldoende zou zijn.

Ook worden de door ons gevonden broedlocaties niet op www.waarneming.nl gemeld om ongewenst bezoek te vermijden. De door derden gemelde waarnemingen werden wel gebruikt na verificatie.

De laatste jaren zijn er nieuwe verschijnselen geconstateerd:

- steeds vaker worden Sperwernesten in de ei-fase gepredeerd door Steenmarter en mogelijk Eekhoorn?
- Buizerd- en Havik-horsten worden met enige regelmaat "gekraakt" door Nijlganzen.

Resultaten 2014:

| | aangetroffen: | geschat maximum: |
|-------------|---------------|------------------|
| Wespendief: | 2 | 5 |
| Buizerd: | 58 | 70 |
| Sperwer*: | 15 | 30 |
| Havik | 9 | 12 |
| Torenvalk | 21 | 30 |
| Boomvalk | 8 | 12 |
| Slechtvalk | 2 | 2 |

*) Het lijkt er op dat de Sperwer nogal eens onopgemerkt is gebleven; ook kan er sprake zijn van een significante afname.

Broedsucces:

Hoewel er geen betrouwbaar beeld gegeven kan worden van de broedresultaten, is wel de algemene indruk dat de muizeneters onder de roofvogels (Buizerd en Torenvalk) het geweldig goed hebben gedaan.

Cees van Beinum
(projectcoördinator roofvogels)

